

Introducción a Partículas y Física Nuclear

Guía 07

1er semestre 2014

- Una partícula con masa m_1 y energía E_1 colisiona frontalmente con otra inicialmente en reposo de masa m_2 .
 - Mostrar que la energía total en el sistema centro de masa (aquel en el que el impulso lineal total es nulo) es $E_{CM}^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2m_2E_1$.
 - Calcular E_{CM} para el caso en que ambas partículas se mueven en direcciones opuestas, con momento lineal $\vec{p}_1$ y $\vec{p}_2$.
 - Mostrar que si su energía es grande comparada con la energía en reposo, $E_{CM}^2 \approx 4E_1E_2$.
 - Verificar que si la colisión no es frontal el resultado se reduce por un factor $(1 + \cos \theta)/2$, siendo θ el ángulo entre los haces.
 - El Large Hadron Collider (CERN) es un colisionador de protones con una energía de centro de masa de 7 TeV. Para obtener la misma energía de centro de masa en un acelerador que bombardeara un blanco fijo, ¿qué energía habría que darle a los protones?
proceso $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ es $\sigma = \frac{4\pi}{3} \frac{\alpha^2}{E_{cm}^2}$. Expresar su valor en nb en el caso de haces colisionantes de electrones y positrones con energías de 5 GeV cada uno.
- (*) ¿Cuál es la distancia recorrida por un muon con energías de 1 y 10 GeV? Un cálculo similar muestra cómo los muones producidos por los rayos cósmicos en la atmósfera, dependiendo de su energía, pueden medirse en la superficie terrestre.
- Calcular la energía cinética del muón producto del decaimiento de un pión en reposo $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$ (para simplificar el problema se puede suponer que el neutrino tiene masa nula, ¿por qué?).
- (*) A partir de cierto umbral de energía, los protones no pueden propagarse libremente por el universo pues al colisionar con fotones del fondo de radiación cósmica puede producirse la reacción $p + \gamma_{CMBR} \rightarrow p + \pi^0$ (efecto conocido bajo el nombre de "supresión de GZK"). Calcular el umbral de energía, aproximando que los fotones de la radiación cósmica tienen la energía correspondiente al pico del espectro de cuerpo negro a $T = 2,7$ K. Estimar el camino libre medio de los protones con esa energía si la sección eficaz del proceso es aproximadamente 0,1 mbarn, y hay 420 fotones en cada cm^3 del universo.
- Explicar los significados de: bosón, fermión, hadrón, leptón, barión, mesón. Dar un ejemplo de cada uno. ¿Cuáles términos caracterizan al fotón y cuáles no?
- No hay mesones conocidos con carga 2. Dar una explicación simple para este resultado experimental.
- (*) El quark top fue descubierto en Tevatron en el año 1.994. Utilizando el canal de decaimiento $t \rightarrow bW^+ \rightarrow b\bar{u}d$ es posible medir m_t . Busque en una tabla el ancho de decaimiento del W y calcule su vida media. Verifique, estimando la distancia recorrida por el W , que no es posible medir el estado intermedio en el decaimiento de un t en reposo, sin embargo sí se puede medir la masa del W en este proceso. Explique cómo se miden m_t y m_W , exprese estas masas en función de las energías de las partículas finales (como aproximación se pueden despreciar las masas de las partículas más livianas).
- El rango de la interacción nuclear fuerte es $a \simeq 1,2 \times 10^{-15}$ m. Mediante análisis dimensional estime la masa del π usando este dato.
- Utilizando la conservación de E, Q, B, L, S , diga si son posibles o no las siguientes reacciones involucradas. Indique la energía umbral de las partículas iniciales.

$$(a) \nu_\mu + n \rightarrow e^- + p; \quad (b) \tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e; \quad (c) p + p \rightarrow \Sigma^+ + n + K^0 + \pi^+ + \pi^0.$$