

Introducción a Partículas y Física Nuclear

Guía 12

1er semestre 2014

1. En el estado ligado de un núcleo de deuterio y un pion $\pi^- d$, con $\ell = 0$, el pion puede ser absorbido por el deuterio por efecto de las interacciones fuertes

$$\pi^- + d \rightarrow n + n .$$

Usando que el estado inicial tiene $j = 1$ (los espines del π y el d son cero y uno respectivamente), y que la paridad intrínseca del deuterón es $+1$, mostrar que la paridad intrínseca del pion es -1 .

2. El pion decae predominantemente según la reacción: $\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$. Para piones en reposo, sólo se observan muones de quiralidad R . Mostrar que esto implica violación de paridad y decir cuál es la interacción responsable del decaimiento. Hacer el diagrama de Feynman y mostrar que también puede decaer a: $e^- \bar{\nu}_e$. Usando que la tasa de decaimiento es proporcional a $m_\ell^2(m_\ell^2 - m_\pi^2)^2$ ($\ell = e, \mu$), comprobar que el decaimiento a muones domina por un factor $1,2 \times 10^{-4}$.
3. K^0 y $\bar{K}^0$ no son autoestados de CP , defina autoestados de CP como combinación de K^0 y $\bar{K}^0$ y obtenga sus autovalores bajo transformaciones de CP . Transformar CP los estados de 2 y 3 piones. Suponiendo que se conserva CP , establezca cual es el estado de kaones neutros que decae a 2 piones y cual a 3 piones. ¿A qué se llama K_L y K_S ? ¿Por qué el decaimiento $K_L \rightarrow 2\pi$ implica la violación de CP ?
4. (*) El lagrangiano que describe un fermión de Dirac y el campo electromagnético libres es:

$$\mathcal{L}_{\text{libre}} = \bar{\psi}(x)(i\partial\!\!\!/ - m)\psi(x) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

- a) Obtener las ecuaciones de movimiento del fermión de Dirac ψ y del campo electromagnético A_μ libres.
- b) El lagrangiano que describe las interacciones de un fermión de Dirac con el campo electromagnético es:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = e\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)A_\mu$$

Verificar que $\mathcal{L}_{\text{libre}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$ es invariante ante una transformación de medida local

$$\begin{cases} \psi(x) \rightarrow e^{ie\alpha(x)}\psi(x) \\ A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu\alpha(x) \end{cases}$$

5. Mostrar que un término de masa para el campo A_μ del tipo $m^2 A_\mu A^\mu$ rompe la invariancia de gauge del Lagrangiano de QED.
6. Opcional: en el mecanismo de Higgs los fermiones y bosones adquieren masa por interacción con un campo escalar complejo ϕ que tiene un valor de expectación en el vacío no nulo: $\langle 0|\phi|0\rangle \neq 0$. Demostrar que, si el campo escalar transforma como $\phi(x) \rightarrow e^{ie\alpha(x)}\phi(x)$, el siguiente lagrangiano es invariante de gauge y contiene un término de masa para A_μ si $\langle 0|\phi|0\rangle \neq 0$:

$$\mathcal{L}_\phi = |(\partial_\mu - ieA_\mu)\phi|^2 - m^2|\phi|^2 .$$